

ANTHICIDE ET PEDILIDE (COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÈRES) REUEILLIS AI
SIKKIM PAR M. HARMAND, ET OFFERTS PAR LUI AU MUSÉUM D'HISTOIRE
NATURELLE,

PAR M. MAURICE PIC.

Les Insectes faisant l'objet de cet article ont tous été recueillis en 1890 à Dardjiling (Sikkim), par M. Harmand, et font partie des collections du Muséum de Paris. *Anthicus Harmandi* existe aussi dans la collection M. Pic.

? *Stereopalpus angusticollis* n. sp.

Très grand, allongé, subparallèle, ♀ modérément et ♂ très étroit (à pubescence grisâtre couchée ou un peu soulevée, parsemée de quelques longs poils obscurs dressés), noir à peine brillant avec la base des cuisses rougeâtre, les élytres ornés de macules pubescentes irrégulières d'un jaune doré. Tête plus longue que large, bien arrondie et non élargie sur ses angles postérieurs, plus atténuée en arrière chez ♂ que ♀, séparée par un sillon transversal bien marqué du cou qui est large, à ponctuation irrégulière dense, avec une petite partie entre les yeux lisse et brillante; yeux moyens, bien saillants. Palpes foncés à dernier article peu long, subcultri-forme. Antennes en partie rembrunies, grêles, courtes, n'atteignant pas la base du prothorax, à dernier article un peu plus long que le précédent. Prothorax étroit, bien plus long que large, à ponctuation dense peu forte (muni antérieurement d'une partie plus étroite où s'emboîte le cou, terminée postérieurement par un sillon transversal plus marqué sur les côtés), sinué sur les côtés, un peu élargi sur la base qui est largement rebordée, fortement sillonné sur le milieu du disque. Écusson plus long que large, subarqué au sommet, sillonné sur son milieu. Élytres à peu près deux fois aussi larges que le prothorax, allongés, très étroits et presque parallèles ♂, modérément étroits et un peu étranglés sur leur milieu ♀, subarrondis à l'extrémité avec une courte impression humérale, les épaules arrondies, assez marquées et un peu saillantes, à ponctuation très forte avec quelques rides transversales peu marquées; ils sont noirs un peu métalliques et ornés de macules d'un jaune doré irrégulières et irrégulièrement disposées. Dessous du corps foncé, pubescent. Pattes moyennes, pubescentes noires, d'un noir bleuâtre à l'extrémité des cuisses, avec la base des cuisses, et parfois une partie des tibias, rougeâtres.

Long. ♂ 9,3 mill., ♀ 15 mill., largeur ♂ 2,3. ♀ 4 mill.

Je classe provisoirement dans le genre *Stereopalpus* cette remarquable espèce, en attendant qu'une étude plus approfondie permette probablement de créer à son profit une coupe générique ou sous-générique nouvelle. Par la forme de sa tête aux angles postérieurs peu marqués et celle de son pro-

thorax long et étroit, cette espèce se distinguera à première vue et facilement des autres espèces du groupe.

Macatria Harmandi n. sp.

Grand, étroit et allongé, entièrement brun roussâtre, avec les padpes, les antennes, l'abdomen et les quatre pattes antérieures testacées; pubescence générale jaunâtre couchée, assez rapprochée, avec quelques poils clairs ou obscurs dressés. Tête assez longue, finement ponctuée, nettement diminuée derrière les yeux, fortement impressionnée sur son milieu postérieur, ce qui fait saillir en gibbosité bien marquée chaque partie latérale de cet organe: yeux noirâtres, grands. Antennes minces, courtes, à dernier article un peu plus long que le précédent. Prothorax très long, presque parallèle sur les côtés, peu diminué en avant, un peu élargi sur la base qui est rebordée, sillonnée sur le milieu du disque, à ponctuation granuleuse dense. Écusson très large, pubescent. Élytres étroits, allongés, un peu atténués en arrière et subarrondis séparément à l'extrémité, à stries peu marquées avec les intervalles nettement ponctués: suture relevée sur le milieu. Pattes assez robustes, les quatre antérieures étant plus claires.

Long. 8 mill. environ.

Espèce reconnaissable à sa grande taille jointe à une forme assez étroite, une tête nettement bigibbeuse en arrière, etc. Plus étroit que *canaliculata* Pic. du Brésil, avec la tête très atténuée en arrière, autrement conformée.

Dédié au voyageur qui a recueilli cette nouveauté ainsi que *Anthicus Harmandi* et plusieurs autres espèces.

FORMICOMUS LAGENICOLLIS Fairm. (Ann. Belg. . 1894, p. 41).

En décrivant cette espèce du Bengale, M. Fairmaire ne parle pas des sexes. Les deux sexes ont été recueillis par M. Harmand; la ♀ paraît offrir une coloration plus claire aux quatre pattes antérieures, avec, bien entendu, les cuisses antérieures simples: le ♂ présente aux cuisses antérieures une sorte d'appendice particulier, long, obliquement tronqué au sommet, dont la partie externe est parfois prolongée en courte dent. Un exemplaire a le prothorax légèrement obscurci.

Anthicus Buyssoni n. sp.

Allongé, subparallèle, un peu brillant (à pubescence grisâtre ou jaunâtre espacée), en partie noir et en partie brunâtre, avec la première moitié des élytres plus claire. Tête foncée assez grosse, subtronquée en arrière, très fortement et assez densément ponctuée avec les yeux gris. Antennes peu longues, assez grêles, testacées obscurcies et un peu épaissies à l'extrémité. Prothorax subtrapézoïforme, foncé avec le rebord basal testacé, densément et assez fortement ponctué, légèrement arrondi sur les côtés de sa dilatation antérieure. Écusson peu marqué. Élytres allongés, peu larges, presque pa-

rallèles, brunâtres mais plus clairs sur leur moitié antérieure, à ponctuation forte et espacée avec une dépression posthumérale peu profonde. Pattes courtes avec les enisses et le milieu des tibias plus foncés. Dessous du corps foncé.

Long. 3 mill. environ.

Par sa forme, cette espèce se rapproche de *A. morio* Laf., mais tête moins grosse, coloration différente: la coloration très particulière de cette espèce la distingue facilement.

Je dédie cette espèce à M. R. du Buysson dont les intéressants travaux sur les *Chrysidés* sont justement appréciés de tous.

***Anthicus externus* n. sp.**

Suboblong, assez brillant (à pubescence peu longue, en partie soulevée), testacé avec une large macule brune sur la partie médiane externe des élytres. Tête moyenne, nettement atténuée et subarquée en arrière, à ponctuation forte, un peu écartée avec les yeux gris. Antennes claires, assez courtes, nettement épaissies à l'extrémité, le dernier article étant un peu plus long que le précédent. Prothorax peu long, largement dilaté-arrondi en avant, presque droit ensuite sur les côtés, avec une sorte de dépression latérale; il est nettement rebordé et présente une ponctuation très forte et rapprochée. Écusson assez petit, testacé. Élytres assez courts, très peu élargis sur leur milieu, nettement atténués à l'extrémité où ils sont légèrement tronqués-arrondis, avec une dépression post-humérale bien marquée et une ponctuation très forte et peu écartée; ils sont testacés, mais ornés sur leur milieu d'une large tache brune qui n'atteint pas la suture; pointe des épaules un peu rembrunie. Pattes assez fortes, courtes, testacées avec les tibias en partie rembrunis. Dessous du corps de la couleur du dessus, avec l'abdomen un peu rembruni.

Long. 2,3 mill.

Paraît devoir se placer près de *flavomaculatus* Laf., des Indes Or., mais très nettement séparable de cette espèce (ex-description) par sa coloration. Diffère de *A. setosus* Laf. et espèces voisines par sa coloration en majeure partie claire et les poils dressés paraissant moins longs.

L'exemplaire unique que j'ai étudié paraît un peu défloré, il n'est donc pas facile pour cela de comprendre sûrement sa pubescence: en dehors de celle-ci, cette espèce reste particulière par son coloris joint à la forme de sa tête bien atténuée en arrière.

***Anthicus Harmandi* n. sp.**

Oblong, très brillant (à pubescence soyeuse fine et ordinairement enlevée), entièrement noir avec le prothorax rouge. Tête large, inensiblement diminuée postérieurement, subarquée en arrière, à ponctuation forte et espacée, avec les yeux grisâtres. Antennes entièrement foncées, quelquefois

roussâtres à la base, moyennes, progressivement épaissies à l'extrémité, le dernier article étant bien plus long que le précédent. Prothorax plus long que large, très dilaté-arrondi en avant, sinué sur les côtés, avec la base élargie et marquée en dessus d'un sillon, celui-ci arqué en avant, avec une dépression latérale bien marquée; ponctuation forte, peu écartée. Écusson triangulaire, foncé. Élytres bien plus larges que le prothorax, élargis sur leur milieu, subtronqués ♂, ou obliquement tronqués ♀, à l'extrémité légèrement déprimés sur le disque, à ponctuation écartée et assez marquée. Pattes grêles, foncées, quelquefois avec les tibia et tarsi un peu testacés.

Long, 3-3,5 mill.

Voisin de *A. fossicollis* Laf., des Indes orientales, par la structure de son prothorax, mais tête noire, élytres concolores, pattes plus foncées.

DEUX ESPÈCES NOUVELLES D'HÉMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR A. L. MONTANDON.

Coptosoma Excoffieri n. sp.

De forme subarrondie, assez convexe en dessous comme en dessus. Jaunâtre à petits points enfoncés noirs; une bande ondulée transversale sur la partie antérieure du pronotum, partie postérieure de la tête et tylus noirs ainsi que la plus grande partie du dessous du corps.

Tête petite, lisse, brillante, à ponctuation très faible et superficielle, subarrondie en avant où elle dépasse le niveau des yeux d'une longueur égale au diamètre de l'œil; joues presque entièrement jaunes, très étroitement noires le long du tylus, légèrement convergentes en avant mais non confluentes devant le tylus; celui-ci noir, à peine rétréci et très étroitement jaunâtre à l'extrémité. Partie postérieure de la tête noire depuis le niveau du milieu des yeux avec un point jaunâtre allongé longitudinalement derrière la base du tylus; ce point jaunâtre peut parfois manquer. Yeux petits, subglobuleux; espace interoculaire environ trois fois plus large qu'un œil.

Pronotum lisse sur sa partie antérieure ornée d'une bande transversale noire formée de deux larges circonflexes, un de chaque côté sur les cicatrices, se rejoignant au milieu où une petite ligne noire longitudinale atteint en avant l'étroit bourrelet noir du bord antérieur, et en arrière le sillon transversal en ligne déprimée, enfoncée et assez fortement ponctuée, bien visible même sur le disque; cette petite ligne noire médiane longitudinale paraît quelquefois un peu écourtée. Dilatations latérales étroites, à ponctuation concolore, bien limitées en arrière par une ligne de points enfoncés, confluentes, parfois en grande partie noirs. Partie postérieure du